



Anthonome du fraisier (*Anthonomus rubi*)



Renseignements

Adulte

D'une longueur de 2 à 3,2 mm (sans le rostre), ce ravageur est habituellement noir, mais présente parfois des reflets rouges ou bruns. Les élytres ont une pubescence grise et clairsemée. Le premier segment du funicule antennaire est deux fois plus long que large. Les antennes émergent du dernier tiers du rostre.

Larve

D'une longueur de 3 à 3,5 mm, la larve est courbée en forme de « C » et est blanche avec une tête brune.

Œufs

Les œufs sont blancs, lisses, brillants et légèrement ovoïde. Ils sont déposés dans des trous faits dans le tissu floral de l'hôte.

Répartition

Europe centrale, du Nord et de l'Ouest; Amérique du Nord

Hôtes

Les hôtes sont habituellement le fraisier (*Fragaria*) et dans une moindre mesure, le framboisier (*Rubus*).

Symptômes

Après l'oviposition dans le bouton floral, les femelles coupent le pédoncule pour empêcher la circulation de la sève, empêchant ainsi le développement de la fleur. Les adultes se nourrissent du feuillage. L'agitation des plants devrait permettre de détecter la présence d'adultes.

Génération : Une par année

Code d'appât

40IPS30

Mode d'action

Attractif aux phéromones sexuelles

Produits chimiques actifs

Grandlure I, grandlure II, lavandulol et un composé volatile végétal

Type de produit

Appât standard avec 28 mg de phéromones et 0,5 g de kairomones

Distributeur

Petit bouchon de cire et petit flacon de polymère dans un sachet semipermeable qui doit être suspendu sous le couvercle (ne pas ouvrir ce sachet)

Vie utile

De 5 à 7 semaines (selon la température)

Surveillance

Présence d'adultes

D'avril à juin

Positionnement du piège

Placer le piège sur le sol à une hauteur similaire à celle des plants. Si un piège à ailettes est utilisé, enfouir le seau. Idéalement, les pièges devraient être en bordure des plants là où les dommages sont plus importants.

Densité recommandée pour les pièges

De 2 à 4 pièges par hectare

Pièges recommandés



Piège Vernon
No. produit 40INT03



Piège à fosse de la couleur illustrée avec petites ailettes

Entretien du piège

Vérifier les pièges sur une base périodique (au moins une fois par semaine). Il est recommandé de remplacer le distributeur de phéromones aux 4 semaines pour obtenir des résultats optimaux.

Entreposage

Conserver le produit à l'abri des rayons du soleil, de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. La durée de conservation est de 12 mois au réfrigérateur ou de 18 mois au congélateur. Toujours ranger le produit dans son emballage original scellé.